

# PRODUCTOS VETERINARIOS PARA MASCOTAS



**CLAVE PARA LA SALUD  
DE LAS MASCOTAS**



## ESTRATEGIA DE LIDERAZGO: DE LA MARCA LOCAL A LA INTERNACIONAL

**BIOTESTLAB** — es una empresa experta en el desarrollo, la producción y la comercialización de medicamentos veterinarios en Ucrania y en el extranjero. Nuestro objetivo es convertirnos en líderes mundiales y hacer de Ucrania uno de los principales proveedores globales de medicamentos veterinarios

**\$ 25+M**

Inversiones en  
desarrollo entre  
2021 y 2024

**36**

años de experiencia

**330+**

empleados

**TOP  
20**

en el mundo por gama  
de productos

**20+**

países de  
exportación



# CONTENIDO

## GOTAS EXTERNAS

- TOBRANORM ..... 4
- CIPROX ..... 5
- OTO LOTION ..... 6
- CIPRONORM ..... 7
- OTOFLOX ..... 8

## PREPARADOS UROLÓGICOS

- PHYTOCAT ..... 9

## TRANQUILIZANTES

- ANTISTRESS ..... 10

## REGULACIÓN DEL CICLO DE LAS HEMBRAS MASCOTAS

- ANTILACT ..... 11

## PREPARADOS SEDANTES

- RELAX ..... 12

## ANTIEMÉTICOS

- MAROX ..... 14

## HEPATOPROTECTORES

- GEPAX ..... 16
- HEPACARNITOL ..... 18

## VITAMINAS Y AMINOÁCIDOS

- AMINOVITOL ..... 19

## VITAMINAS E INMUNOESTIMULANTES

- L-CYN ..... 20
- STIMULUS ..... 21

## PREPARADOS PARA TRATAMIENTO EXTERNO

- FLOXY-SPRAY MAX ..... 22

## ANTIBIÓTICOS

- CIPROCOLIN ..... 23
- CEFTIFUR-50 ..... 24
- SPECTRAN ..... 25

**NEW**

# TOBRANORM

**EL ÚNICO MEDICAMENTO  
PARA LOS OJOS EN UCRANIA**

**A base de tobramicina al 0,3 %**



Envase: 10 ml




Tratamiento de enfermedades  
infecciosas e inflamatorias  
de origen bacteriano de los ojos


en 1 ml:  
tobramicina — 3 mg




Aplicar  
1-2 gotas



2-3 veces al día  
durante 7-10 días



Efecto  
antimicrobiano  
pronunciado



Tratamiento  
indoloro

**NEW**

# CIPROX

**POTENTE ACCIÓN:**  
**PARA LA SALUD DE LOS OJOS Y LOS OÍDOS**  
**Solución al 0,5 % de ciprofloxacino**



Envase: 10 ml



Alta concentración de principio activo para el tratamiento eficaz de enfermedades infecciosas e inflamatorias de los ojos y los oídos

En 1 ml:  
ciprofloxacino: 5 mg




Aplicar  
1-2 gotas



2-3 veces al día  
durante 5-7 días



Efecto  
antimicrobiano  
pronunciado



Tratamiento  
indoloro

# OTO LOTION

## DE LA HIGIENE AUDITIVA EL CAMPEÓN

El cuidado comienza con la prevención

en 100 ml

cloruro de benzalconio — 0,5 g    tintura de caléndula — 10,0 g  
alantoína — 0,1 g    aceite de árbol de té — 0,05 g



Tiene efecto antimicrobiano



Alivia la inflamación



Elimina el picor

Elimina la suciedad acumulada

Reduce la cantidad de células muertas



Seca el conducto auditivo

Mejora significativamente la microflora de los oídos

Envase: 30 ml, 100 ml



Aplicar 1-5 ml, masajear el oído durante 15-30 segundos



Dejar el producto en el oído durante 1-2 minutos



Limpiar con un bastoncillo de algodón humedecido en losión



Para el tratamiento de otitis: 1-2 veces al día durante 7-14 días

# CIPRONORM

DOBLE EFECTO

EN EL TRATAMIENTO DE LOS OJOS Y LOS OÍDOS

**Ciprofloxacino + dexametasona, suspensión**



Envase: 10 ml

Tratamiento de otitis  
y conjuntivitis de origen  
bacteriano y alérgico

En 1 ml:  
ciprofloxacino: 5 mg  
dexametasona: 1 mg



Aplicar  
1-2 gotas



2-3 veces al día  
durante 5-7 días



Efecto  
antimicrobiano  
pronunciado



Alivio de la fase  
aguda de la inflamación  
en 24 horas



Económico  
en usar



# OTOFLOX

## ENFOQUE INTEGRADO PARA EL TRATAMIENTO DE OTITIS DE DIFERENTES ETIOLOGÍAS



Antiparasitario  
(ivermectina)

Antimicrobiano  
(fluorfenicol)



Antifúngico  
(clotrimazol)

Antialérgico  
(betametasona)




Envase: 10 ml



Limpiar el oído



Es obligatorio  
gotear en  
ambos oídos



2 veces al día  
durante 5-10 días



Acción rápida y potente



Uso económico





# PHYTOCAT



## LA NATURALEZA EN DEFENSA DE LOS RIÑONES



### **Aerva lanata - 25 mg**

Efecto antiséptico y diurético,  
reduce el nivel de urea y  
expulsa la arena



### **Polygonum aviculare - 12.5 mg**

Efecto antiséptico y diurético,  
reduce el nivel de urea y  
expulsa la arena



### **Arcostaphylos - 5 mg**

Efecto diurético,  
antiinflamatorio y  
salurtico



### **Cola de caballo - 7,5 mg**

Efecto diurético,  
hemostático, mejora  
el estado de las  
paredes capilares

- Alta concentración de principios activos
- Sin efectos secundarios en comparación con los medicamentos sintéticos
- Un envase por ciclo de tratamiento (100 ml) o profilaxis (30, 50 ml)
- Incluye jeringa dosificadora

### **PREVENTION**

2-4 ml por mascote  
1 vez al día  
durante 7-10 días  
cada 3 meses

### **TREATMENT**

2-4 ml por animal  
2 veces al día.  
Curso de 3 semanas



Envases: 30 ml, 50 ml, 100 ml

# ANTISTRESS

## GATO Y PERRO SIN ESTRÉS

En 1 ml: fenibut — 100 mg

### EFFECTO ANTIESTRÉS MARCADO EN CASOS DE:

- 🐾 miedos, agresividad
- 🐾 ansiedad durante el transporte, ruidos fuertes, separación del dueño y otras situaciones cotidianas
- 🐾 excitación sexual elevada

Normalización de los procesos metabólicos en el sistema nervioso central como resultado de la actividad nootrópica

### Aplicar en la cavidad bucal:

**gatos** — 1 gota por 1 kg de peso corporal

**perros** — 2 gotas por 1 kg de peso corporal

¡No más de 2 veces al día!

Curso de tratamiento:

10-15 días.

Frasco para el tratamiento

(para mascotas de hasta 5 kg)

### Prevención del estrés:

3-5 días antes del evento

y durante 1-4 días después



# ANTILACT

## DETENGA LA LACTANCIA SIN HORMONAS

### En 1 ml: cabergolina — 50 mcg

- 💧 Medicamento no hormonal
- 💧 Elimina los signos de pseudopreñez
- 💧 Detiene la lactancia en poco tiempo
- 💧 Previene el desarrollo de mastitis lactacional
- 💧 Normaliza el estado psicoemocional


**PRÁCTICO  
GOTERO  
DOSIFICADOR**



Por vía oral en la  
raíz de la lengua



3 gotas por  
1 kg de peso corporal



1 vez al día  
durante 4-6 días



# RELAX

ANESTESIA SUAVE – TRANQUILIDAD DEL MÉDICO

## SOLUCIÓN EXCLUSIVA VETERINARIA DE PROPOFOL 1 % EN UCRANIA



- SOLUCIÓN COLOIDAL TRANSPARENTE:  
FÁCIL ADMINISTRACIÓN, ACCIÓN RÁPIDA
- VÁLIDO DURANTE 28 DÍAS DESPUÉS DE ABRIR  
EL FRASCO
- AUSENCIA DE REFLEJO GÉMPICO
- SIN FASE DE EXCITACIÓN

Dosis en bolus sin premedicación:  
gatos: 0,6-0,8 ml/kg p.c.  
perros: 0,4-0,65 ml/kg p.c.



Envase: 10 ml, 50 ml

RELAX es una solución coloidal estéril y apirógena de propofol al 1 % para administración intravenosa. Se utiliza en gatos y perros para la anestesia general de corta duración, para la inducción y el mantenimiento de la anestesia principal.

Los conservantes añadidos a la composición del medicamento RELAX garantizan la conservación de la solución estéril hasta 28 días después de abrir el frasco.

En la práctica, para lograr una anestesia adecuada, la dosis del medicamento RELAX debe ajustarse en función de la reacción del animal tras la administración del medicamento. La administración intravenosa se realiza tanto por vía intravenosa como por goteo mediante infusión. Además, para una dosificación más precisa antes de la administración, RELAX se puede disolver en una solución de cloruro de sodio al 0,9 % en una proporción de 1:4. Cuando se utiliza premedicación, se reduce la dosis del preparado RELAX.

Además de la intervención quirúrgica, RELAX se utiliza:

- en la prestación de asistencia médica en caso de lesiones;
- en odontología (extracción de dientes, eliminación de sarro)
- en la realización de ecografías, radiodiagnósticos, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas.

En 2017, el medicamento RELAX se sometió a un estudio clínico en mascotas de destino (perros, gatos), realizado por el DNDKI /Instituto Estatal de Investigación y Control de Preparados Veterinarios y Aditivos para Alimentos/ de medicamentos veterinarios y aditivos alimentarios en condiciones de clínicas veterinarias (ciudad de Lviv). El estudio demostró que el medicamento RELAX es un medio eficaz y seguro para realizar anestesia de corta duración en gatos y perros durante intervenciones quirúrgicas.

### ESQUEMA RECOMENDADO DE APLICACIÓN DE RELAX CON PREMEDICACIÓN

| Premedicación                   |                            |                                     |                              |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de animal                  | Sedazin 2 %                | Meditin 0,1 %                       | Zoletil 100                  |
| Gatos                           | 0,1-0,15 ml por kg de p.c. | 0,05-0,15 ml por 5 kg de p.c.       | 0,05-0,1 ml por kg de p.c.   |
| Perros                          | 0,1-0,15 ml por kg de p.c. | 0,1 – 0,2 ml por cada 10 kg de p.c. | 0,05 – 0,1 ml por kg de p.c. |
| RELAX                           |                            |                                     |                              |
| Gatos: 0,12 ml por 1 kg de p.c. |                            | Perros: 0,1 ml por 1 kg de p.c.     |                              |

RELAX is compatible with drugs used for premedication, muscle relaxants, inhalation anesthetics and analgesics. No adverse pharmacodynamic interactions have been noted.

Postoperative analgesia can be provided with NSAIDs.

**NEW**

# MAROX

## RÁPIDO CONTROL DE LAS VÓMITAS EN SITUACIÓN URGENTE



Envase: 10 ml, 20 ml

### INDICACIONES DE USO:

- Tratamiento y prevención de las náuseas en perros y gatos, incluidas las provocadas por la quimioterapia
- Tratamiento de los vómitos en combinación con otras medidas de apoyo
- Prevención de las náuseas y vómitos postoperatorios y mejora de la recuperación tras la anestesia general

Tratamiento y prevención de las náuseas y vómitas en perros y gatos


Composición:  
En 1 ml: maropitant —10 mg.  
(solución inyectable)

- Bloqueo de los receptores de neuroquinina que provocan el vómito
- Efecto notable a los 30-60 minutos: ideal para situaciones de urgencia
- Duración del efecto terapéutico: hasta 24 horas
- Control fiable de las náuseas postoperatorias y las náuseas provocadas por la quimioterapia
- Flexibilidad de administración, comodidad de dosificación
- Ausencia de efecto sedante
- Tiene efecto analgésico

| APLICACIÓN                       | TRATAMIENTO                                               |                                                                    | PREVENCIÓN                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo y edad de mascota           | Perros<br>2-4 meses                                       | Perros, gatos a partir<br>de 4 meses y mayores                     | Perros, gatos a partir<br>de 4 meses y mayores                                    |
| Dosis y método de administración | 1 mg por 1 kg de p.c.<br>(1 ml por 10 kg de p.c.)<br>S/C* | 1 mg por 1 kg de p.c.<br>(1 ml por 10 kg de p.c.)<br>S/C* o I/V ** | 1 mg por 1 kg de p.c.<br>(1 ml por 10 kg de p.c.)<br>S/C* o I/V **                |
| Curso                            | 1 vez al día<br>hasta 5 días consecutivos                 |                                                                    | 60 minutos antes de la administración del medicamento, que puede provocar vómitos |

\*En caso de administración subcutánea del preparado

\*\*La administración intravenosa debe realizarse durante 1-2 minutos, no mezclar el preparado con otras soluciones




Aplicar en frío\*  
por vía subcutánea



Por vía subcutánea  
o intramuscular



1mg  
por 1 kg de p.c.



1 vez al día  
5 días consecutivos



# GEPAX

Hepatoprotector en solución inyectable para  
perros y gatos basado en ademetionina



## Composición:

- Liofilizado: S-adenosil-L-metionina (SAME, ademetionina)
- Disolvente: L-lisina, excipientes

## Indicaciones de uso:

- Prevención y tratamiento de perros y gatos con enfermedades agudas o crónicas del hígado, la vesícula biliar y las vías biliares.
- Terapia complementaria en caso de enfermedades infecciosas, infestaciones y neoplasias del sistema hepatobiliar.



# APORTA ENERGÍA A LAS CÉLULAS DEL HÍGADO, ACTIVANDO LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE SU ESTRUCTURA Y TODAS SUS FUNCIONES

- Protege el hígado de las toxinas
- Reconstruye la estructura de los hepatocitos
- Restaura la energía de las células

## DOSIFICACIÓN CÓMODA

hasta 10 kg



**GEPAX 100**

SAMe (ademetionina) — 190 mg/vial

10-20 kg



**GEPAX 200**

SAMe (ademetionina) — 380 mg/vial

**Preparar la solución  
inmediatamente antes  
de su uso**



Por vía intravenosa  
Por vía intramuscular  
Por vía subcutánea



1 vez al día  
durante  
5-10 días

# HEPACARNITOL

## HEPATOPROTECTOR COMPLEJO, FÁCIL DE USAR




Envase: 10 ml

### COMPOSICIÓN

En 1 ml de alimento complementario:

hidrocloruro de carnitina: 25 mg  
DL-metionina: 10 mg  
Cloruro de colina: 18,75 mg  
Sulfato de magnesio: 10 mg  
Sorbitol: 200 mg  
Cinarina (extracto de alcachofa): 5 mg



- Protege los hepatocitos del efecto de las toxinas y acelera su regeneración
- Mejora los procesos metabólicos en el hígado
- Previene la distrofia grasa
- Aumenta la inmunidad



**Hasta 10 kg:** 10 gotas  
(0,5 ml)/ mascota

**más de 10 kg:** 20 gotas  
(1 ml)/ mascota



10 gotas (0,5 ml)/  
mascota

10 gotas (0,5 ml)/  
0,5 agua



1 vez al día,  
7-10 días

# AMINOVITOL

## FÓRMULA VITAMÍNICA BALANCEADA PARA SUS MASCOTAS



Envase: 10 ml

### COMPOSICIÓN 1,0 ml de pienso complementario:

Vitamina A - 2500 IU  
Vitamina B<sub>1</sub> - 1.2 mg  
Vitamina B<sub>2</sub> - 4.5 mg  
Vitamina B<sub>6</sub> - 2.5 mg  
Vitamina B<sub>12</sub> - 0.01 mg  
Vitamina C - 30 mg  
Vitamina D<sub>3</sub> - 2250 IU  
Vitamina E - 10 IU  
Vitamina K<sub>3</sub> - 4.5 mg  
Ácido fólico - 0.25 mg;  
Ácido pantoténico - 9.0 mg;  
Biotina - 0.05 mg;  
Nicotinamida - 22.0 mg;  
Cloruro de colina - 50.0 mg;  
Metionina - 10.0 mg;  
Arginina - 10.0 mg;  
Leucina - 12.0 mg;  
Treonina - 2.0 mg;  
Tryptófano - 6.0 mg;  
Lisina - 50.0 mg;  
Valina - 22.0 mg;  
Isoleucina - 8.0 mg;  
Fenilalanina - 10.0 mg;  
Histidina - 6.0 mg.

- Suplementa la deficiencia de vitaminas en el cuerpo del animal
- Apoya el cuerpo del animal en situaciones de estrés
- Promueve una rápida recuperación después del tratamiento



**Hasta 10 kg:** 10 gotas  
(0,5 ml)/ mascota  
**más de 10 kg:** 20 gotas  
(1 ml)/ mascota



10 gotas (0,5 ml)/  
mascota  
10 gotas (0,5 ml)/  
0.5 agua



1 vez al día,  
durante  
7-10 días

# L-CYN

⚡ **AÑADE ENERGÍA Y VIGOR** ⚡

## BUTAFOSFATO

Resistencia al estrés gracias a la reducción del nivel de cortisol, mejora la utilización de la glucosa en sangre: liberación de ENERGÍA

## L-carnitina/B<sub>11</sub>

Mejora el transporte de ácidos grasos a las mitocondrias, estimula la transformación de energía

## B<sub>12</sub>

Normalización del proceso de formación de la sangre

## B<sub>3</sub>

Coenzimas: energía para células y tejidos

**Dosis:** perros, gatos, conejos, roedores: intramuscular, subcutáneo o intravenoso 0,5-2,5 ml por mascota, dependiendo del peso corporal



Envase: 10 ml, 100 ml

# STIMULUS

## ACTIVE LAS FUERZAS VITALES DE SU MASCOTA

en 1 ml nucleinato de sodio, vitaminas y sustancias similares a las vitaminas; aminoácidos, minerales, otros componentes biológicamente activos = **200** SUSTANCIAS BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS



Para todo tipo de mascotas



Por vía subcutánea, por vía intravenosa



Por vía oral con agua



Envase: 10 ml, 100 ml



Propiedades antioxidantes y antihipóxicas



Protege el organismo del estrés



Acorta los plazos de recuperación

- Estimulación de todos los procesos fisiológicos del organismo
- Como medio auxiliar en el periodo postoperatorio
- Restablecimiento de los procesos metabólicos en caso de estrés, infecciones, invasiones, intoxicaciones
- Cría: para estimular el crecimiento y mejorar el desarrollo
- Mascotas agotadas y debilitadas: para una rápida recuperación
- Mascotas viejas: para mantener las funciones vitales

### Dosis:



1 ml/kg de p.c., máximo 20 ml por mascota

# FLOXY-SPRAY MAX

Preparado cicatrizante y antiinflamatorio  
para mascotas no productivas

NO TIÑE,  
SINO QUE CURA



Acción prolongada en  
las zonas afectadas



Comodidad y  
economía



Envases de 9 ml, 30 ml,  
50 ml y 100 ml

## FLORFENICOL 2.5 g

efecto bacteriostático sobre las  
bacterias grampositivas y gramnegativas



## PREDNISOLONA 0.1 g

Tiene acción antiinflamatoria,  
antialérgica y antiexudativa

Tratamiento de dermatitis de cualquier etiología (excepto fúngica), panadizo, pioderma, eczema. También se utiliza en heridas traumáticas y quirúrgicas (incluidas las posteriores a la esterilización), arañazos, picaduras, úlceras y abscesos abiertos.



# CIPROCOLIN

## ANTIBIÓTICO ORAL MODERNO — POLVO PARA PREPARAR SUSPENSIÓN

### DOBLE POTENCIA

Concentración **máxima** en los tejidos: al cabo de 1 hora

Ciprofloxacino  
100 mg/1 g

Colistina  
1 000 000 UI/1 g



Cavidad  
bucal



respiratorios genitourinario  
sistema



otitis,  
conjuntivitis



picaduras,  
infecciones



tracto  
gastrointestinal

100 ml de suspensión preparada son suficientes para  
un tratamiento de 5 días en un perro de 20 kg.

**Dosis: 1 ml/1 kg de p.c.**

- Comodidad y precisión de aplicación:  
gracias a la jeringa dosificadora
- Sabor y aroma agradables a carne:  
buena aceptación por parte de las mascotas
- Aplicación solo una vez al día:  
simplifica el proceso de tratamiento  
para el propietario
- Se puede añadir a la comida




Envase: 100 ml

# CEFTIFUR-50

LOS CASOS COMPLEJOS REQUIEREN SOLUCIONES MODERNAS

En 1 ml: ceftiofur — 50 mg



Envase — 10 ml, 100 ml

# SPECTRAN

COMBINACIÓN ÚNICA PARA UN TRATAMIENTO EFICAZ

Amoxicilina + betametasona

tracto  
gastro-  
intestinal

órganos  
respiratorios

sistema  
genitourinario

infecciones-  
cutáneas

articula-  
ciones

tejidos  
blandos

otitis y  
conjuntivitis

## Composición:

1 ml del medicamento contiene los siguientes principios activos:

**Amoxicilina trihidratada: 150 mg**

**Dipropionato de betametasona: 0,5 mg**

Excipientes

• **antibiótico**  
**actúa sobre bacterias**  
**grampositivas y gramnegativas**  
**efecto antibacteriano**

**hormona sintética**  
**de corteza suprarrenal**  
**efecto antiinflamatorio**  
**efecto antialérgico**

## Modo de administración y dosificación:

intramuscular o subcutáneo en una dosis única de:

1,0 ml del preparado por cada 10 kg de peso corporal de mascota. Si es necesario, el preparado se administra de nuevo al cabo de 48 horas

## INFLAMMATION



Suspensión lista para inyección



Subcutaneously or intramuscularly



Envase: 10 ml, 50 ml



# ESQUEMAS RECOMENDADAS

## CIRUGÍA

### STIMULUS



Estimulación del sistema inmunitario antes de la operación

### MAROX



Prevención de náuseas y vómitos

### RELAX



Anestesia no inhalatoria

### FLOXY-SPRAY MAX



Tratamiento postoperatorio

### CEFTIFUR-50

### SPECTRAN

### CIPROCOLIN

### HEPACARNITOL

### L-CYN



Antibioterapia y alivio de la inflamación

Recuperación del organismo

## OTITIS

### OTO LOTION



### OTOFLOX



### CIPRONORM



### CIPROX



### CIPROCOLIN



Limpieza de oídos

Tratamiento local de la inflamación

Antibioterapia

## CONJUNTIVITIS

## PREVENTION OF NAUSEA

### CIPRONORM



### CIPROX



### TOBRANORM



Tratamiento local de inflamaciones

### MAROX



Prevención y tratamiento de náuseas y vómitos

# TRATAMIENTO DE MASCOTAS

## ENFERMEDADES GENERALES DEL ORGANISMO

### STIMULUS



Estimulación del sistema inmunitario

### CEFTIFUR-50



### SPECTRAN



### CIPROCOLIN



Antibioterapia y alivio de inflamaciones

### HEPACARNITOL



### AMINOVITOL



### L-CYN



Recuperación del organismo

## SISTEMA NERVIOSO

## UROLOGÍA

### ANTISTRESS



Eliminación del estrés

### PHYTOCAT



### CEFTIFUR-50



### CIPROCOLIN



Antibioterapia y eliminación de inflamaciones

## ENDOCRINOLOGÍA

## ENFERMEDADES DEL HÍGADO

### ANTILACT



Pseudogestación

### GEPAX



Hepatoprotector  
inyectable

### HEPACARNITOL



Hepatoprotector  
oral



COOPERACIÓN  
CON BIOTESTLAB

