



BOVIMUN PREMIUM PROTECTION

¿Vacunación de ganado? ¡Confíe en la línea BOVIMUN!

BOVIMUN 4

Vacuna combinada contra el complejo de enfermedades reproductivas y respiratorias bovinas, liofilizado + suspensión como disolvente para inyección

Una dosis (3,0 ml) contiene:

Suspensión:

- Virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina, cepa BM $\geq 10^{7.0}$ TCID₅₀
- Virus de la parainfluenza bovina tipo 3, cepa BR-11 ≥ 480 HAU
- Virus de la diarrea bovina, cepa D-13 $\geq 10^{6.0}$ TCID₅₀

Componente liofilizado:

- Virus vivo de la infección respiratoria sincitial bovina, cepa PC-09 $\geq 10^{4.0}$ TCID₅₀

BOVIMUN 4 estimula la formación de inmunidad a un nivel protector contra la rinotraqueítis infecciosa, la diarrea viral, la parainfluenza-3 y la infección respiratoria sincitial bovina 2 semanas después de la vacunación. Garantiza 12 meses de protección. Seguro para su uso en vacas: administración en cualquier etapa de la gestación y lactancia.

Administración intramuscular.

Formas cómodas de expedición: 10 dosis y 30 dosis

Enfermedades reproductivas y respiratorias



Programa de vacunación



Estudios en animales de laboratorio (conejos) y productivos (terneros) han determinado la proporción óptima de antígenos en la vacuna y la proporción antígeno-adyuvante de 60/40, respectivamente, para la formación de anticuerpos protectores en los animales vacunados. Máxima conservación de las propiedades inmunogénicas de la vacuna gracias a métodos probados de inactivación de cada virus de la vacuna.

BOVIMUN NEO

Vacuna polivalente inactivada contra la diarrea neonatal (diarrea del ternero), en suspensión inyectable

Una dosis (2,0 ml) contiene:

- Rotavirus bovino, cepa RP-182 $\geq 7,0$ Ig TCID₅₀
- Coronavirus bovino, cepa CV-315 ≥ 256 HAU
- *Escherichia coli*, cepa EC18 $\geq 9,0$ Ig CFU
- *Clostridium perfringens* tipo C, cepa Cl.p.-19, toxoide $\geq 20,0$ UI

BOVIMUN NEO forma inmunidad específica en vacas o novillas vacunadas contra los agentes causantes más comunes de la diarrea en terneros. Los anticuerpos resultantes se transfieren con el calostro y proporcionan protección pasiva hasta los 45 días de edad.

Administración intramuscular. Disponible en dosis: 5, 25, 50.

Diarrea neonatal (diarrea del ternero)



Programa de vacunación



BOVIMUN MAST

Vacuna polivalente inactivada contra la mastitis, en suspensión inyectable

Una dosis (5,0 ml) contiene:

- *Streptococcus agalactiae*, cepa St.ag-19 $\geq 8,0$ Ig UFC
- *Streptococcus uberis*, cepa St.ub-19 $\geq 8,0$ Ig UFC
- *Staphylococcus aureus*, cepa Staph.au-19 $\geq 8,0$ Ig UFC
- *Escherichia coli*, cepa UA J5 $\geq 9,0$ Ig UFC

Prevención de la mastitis clínica y subclínica y de la endometritis posparto causadas por los patógenos mencionados. Se forma una respuesta inmunitaria protectora entre 8 y 10 días después de la doble administración, que dura hasta 6 meses. Las vacas vacunadas transfieren inmunoglobulinas a través del calostro, lo que protege a los terneros recién nacidos.

Administración intramuscular. Disponible en dosis: 2, 10, 20

Mastitis de vacas



Programa de vacunación





BOVIMUN PREMIUM PROTECTION

¿Vacunación de ganado? ¡Confíe en la línea BOVIMUN!

BOVIMUN LSD

Vacuna viva contra la dermatosis nodular contagiosa (dermatosis nodular), liofilizado + disolvente para inyección

Basada en la cepa Neethling. Según las recomendaciones de la OIE y la FAO, las vacunas homólogas basadas en la cepa Neethling proporcionan una prevención más eficaz de la LSD en comparación con las vacunas basadas en cepas del virus de la viruela ovina. Estas vacunas se utilizan desde hace más de 60 años y, hasta la fecha, no se ha informado de que el virus de la vacuna haya recuperado su virulencia en los rebaños vacunados. La vacunación masiva contra la LSD con vacunas vivas basadas en la cepa Neethling se considera la medida de control más eficaz en la UE y en la mayoría de los países de Asia y África, incluso desde un punto de vista económico.

Rápida formación de inmunidad activa. BOVIMUN LSD estimula la formación de inmunidad 10 días después de una sola vacunación. La inmunidad activa se produce el día 21 después de la inmunización, y la duración de la inmunidad es de hasta 1 año.

Seguro para vacas gestantes. BOVIMUN LSD está formulado para garantizar la seguridad de las vacas gestantes. Esto significa que los ganaderos pueden administrar la vacuna en cualquier época del año. La leche de las vacas vacunadas se utiliza sin restricciones.

Administración subcutánea. Disponible en dosis de: 5, 10, 25, 50, 100.

Dermatosis Nodular Contagiosa



Programa de vacunación



Una dosis de la vacuna BOVIMUN LSD (1,0 ml) contiene el virus de la Dermatosis Nodular Contagiosa, cepa Neethling $> 10^{3.8}$ TCID₅₀. Esta vacuna tiene una actividad antigénica superior a la de las principales vacunas de la competencia, que tienen una sola dosis inmunizante (2,0 ml) que contiene $> 10^{3.5}$ TCID₅₀. Esto es el resultado de las modernas tecnologías de alto rendimiento para la purificación y concentración de virus utilizadas en BIOTESTLAB

ANTIBIÓTICOS

Inyectable

AMOXAN PREMIUM	Suspensión de amoxicilina, micronizada, L.A.
CEFTIFUR-50	Suspensión de ceftiofur
CLAMOXAN	Suspensión de amoxicilina, ácido clavulánico
DANOXAN-25	Solución de danofloxacina
ENROXAN-50	Solución de enrofloxacin
ENROXAN-100	Solución de enrofloxacin
ENROXAN MAX	Solución de enrofloxacin, L.A.
FLOCINE-300	Solución de florfenicol
OTC-200 L.A.	Solución de oxitetraciclina, L.A.
PHARMAXIN-200	Solución de tilosina
SPECTRAN	Suspensión de amoxicilina, betametasona
TILMICON-300	Solución de tilmicosina
TULAXAN	Solución de tulatromicina, L.A.

Oral

ENROCOLIN	Solución de enrofloxacin, colistina
ENROXAN-100	Solución de enrofloxacin
TILMICON-250	Solución de tilmicosina
TRICOLIN	Solución de enrofloxacin, trimetoprim, colistina

Polvos

COLIDOXYN	Polvo de colistina, doxiciclina
COLISTO 6M	Polvo de colistina
COLITYL P	Polvo de colistina, tilosina
DOXAN-50	Polvo de doxiciclina
PHARMADOX P	Polvo de doxiciclina, tilosina

Externo

FLOXY-SPRAY	Spray de florfenicol.
-------------	-----------------------

AINE / AINE + ANTIBIÓTICO

KETOPRO-100	Solución de ketoprofeno, inyectable
KETAFUR	Suspensión de ketoprofeno, ceftiofur, inyectable

ANTIPARASITARIOS

CLOSLIVERON	Solución de closantel, ivermectina, inyectable
DORAN	Solución de doramectina, inyectable
IVERON-10	Solución de ivermectina, inyectable

ANTICOCCIDIOS

TOLTRASAN-50	Solución oral de toltrazuril
--------------	------------------------------

COMPLEJOS DE VITAMINAS Y MINERALES

AMINOVITOL	Vitaminas y aminoácidos, solución oral
HEPACARNITOL	Hepatoprotector, solución oral
L-CYN	Vitaminas B ₁₂ , B ₃ , L-carnitina,
STIMULUS	Complejo de sustancias biológicamente activas, inyectable



Descargue nuestro catálogo completo