

FLOXY-SPRAY

Fluorfenicol 2,5%



ALTERNATIVA MODERNA
A LOS SPRAYS CLÁSICOS



FLUORFENICOL: NUEVO ESTÁNDAR DE EFICACIA DE LOS SPRAYS ANTIMICROBIANOS

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN


Bacterias Gram(+).
Bacterias Gram(-),
micoplasmas.

ACTIVIDAD CONTRA LAS BACTERIAS GRAM(-)

Incluidas las cepas
resistentes a la tetraciclina

BAJO RIESGO DE RESISTENCIA

Gracias a otro
mecanismo de acción



ALTA ESTABILIDAD

Eficacia en lesiones
purulentas y necróticas

FLOXY-SPRAY VS SPRAYS CLÁSICOS

	SPRAYS DE TETRACICLINA		FLOXY-SPRAY
Principio activo	Clortetraciclina	Oxitetraciclina	Fluorofenicol
Tipo de acción	Bacteriostática	Bacteriostática	Bacteriostática
Acción sobre bacterias Gram(+)	Alta	Alta	Alta
Acción sobre bacterias Gram(-)	A menudo débil, riesgo de resistencia	Moderada, depende de la cepa	Alta, incluyendo cepas resistentes
Resistencia	Alta (genes TET), especialmente con el uso prolongado		Baja
Estabilidad en heridas necrosadas	Baja (los materiales orgánicos y las unidades Ca/Mg reducen la eficacia)		Alta

FLOXY-SPRAY una alternativa moderna con un amplio espectro de acción, alta eficacia contra bacterias resistentes a la tetraciclina y estabilidad en casos complejos

MÁXIMA SEGURIDAD EN CADA PULSACIÓN



FÓRMULA OPTIMIZADA

- Sin cristalización del contenido
- Homogeneidad durante el almacenamiento
- Colorante alimentario seguro

FRASCO DE ALTA CALIDAD

- Pulverización uniforme
- Alta hermeticidad
- Diseño ergonómico

ACCIÓN PROLONGADA

- Fijación fiable sobre la piel
- Penetración profunda en el lugar de la infección
- Protección contra la recontaminación




APLICACIÓN Y DOSIS


INDICACIONES DE USO						
Signos de lesiones purulentas-necróticas e infecciosas en las extremidades	•	•	•	•	•	•
Procesos inflamatorios agudos en la zona del cordón umbilical	•	•	•	•	•	•
Tratamiento de la piel después de intervenciones quirúrgicas	•	•	•	•	•	•
Lesiones traumáticas de la piel (heridas, grietas, arañazos, rasguños, mordeduras, contusiones, úlceras)	•	•	•	•	•	•
Dermatitis de origen bacteriano, causadas por microorganismos sensibles al fluorfenicol	•	•	•	•	•	•
Antes de aplicar el preparado, se limpia cuidadosamente la zona afectada de exudado y tejidos necrosados.						




Agitar
el frasco.



Pulverizar
1-2 veces.



Repetir cada
12 horas.



Curso -
hasta 10 días

¡IMPORTANTE

Antes de aplicar el medicamento, es imprescindible limpiar a fondo la zona afectada para retirar exudado y tejido muerto.

CARENCIA: 0 DÍAS: No pulverizar el spray sobre las ubres de animales cuya leche se utilice para el consumo humano y la alimentación de animales

Fabricante:



www.biotestlab.ua | info@biotestlab.ua

