



SUIMUN PROTECCIÓN PREMIUM

Aprobado por millones de cerdos

VACUNAS VIVAS:

SUIMUN ADIVAC+ Enfermedad de Aujeszky, cepa Bartha K61 $\geq 10^{5.0}$ TSG₅₀

SUIMUN CSF LK-M La peste porcina clásica, cepa LK-M ≥ 3.0 lg TCID₅₀

SUIMUN ERY La erisipela porcina, cepa WR2B $\geq 4,0 \times 10^{6.0}$ de bacterias vivas

VACUNAS INACTIVADAS:

SUIMUN ADIVAC Enfermedad de Aujeszky, cepa K61 $\geq 8,0$ lg TSG₅₀ en ml antes de la inactivación

SUIMUN ERY INAC La erisipela porcina, cepa WR2B $\geq 2 \times 10^{10}$ en ml antes de la inactivación

SUIMUN PARVO ERY INAC El parvovirus y la erisipela porcina:

Parvovirus porcino, cepa I-82 ≥ 9 log₂ HAU

Erisipela porcina, cepa WR2B $\geq 1 \times 10^{10}$ UFC en ml antes de la inactivación

SUIMUN PED la diarrea epidémica porcina, cepa U-14 $\geq 10^{4.0}$ TSG₅₀ en ml antes de la inactivación

SUIMUN TESCHEN La enfermedad de Teschen, cepa Zacarpatsky $\geq 8,2$ lg TSG₅₀ en ml antes de la inactivación

SISTEMAS DE PRUEBA:

RABITEST-RIF Kit de inmunoglobulinas antirrábicas fluorescentes

TEST KIT ADV gE- ELISA Diferenciación de la enfermedad de Aujeszky en rebaños vacunados con gE, in vitro

TEST KIT ADV TOTAL ELISA Identificación de anticuerpos totales contra la enfermedad de Aujeszky, in vitro

Aumenta la rotección



Aumenta el crecimiento



Aumenta la rentabilidad



SUIMUN CSF LK-M

Protección rápida y duradera contra la peste porcina clásica

Vacuna viva cultivada contra la peste porcina clásica. Cepa: LC-M, obtenida en un cultivo primario de células de testículos de corderos: la dosis protectora de la vacuna es entre 10 y 100 veces mayor en comparación con la cepa china laparizada C.

La protección posvacunal se mantiene entre 4 y 6 días después de la vacunación, durante al menos un año. La seguridad de la vacuna se ha demostrado durante la vacunación de lechones con una dosis 1000 veces superior: no se observaron reacciones posvacunales ni inmunosupresión.

La vacuna es eficaz en regiones/explotaciones prósperas y desfavorecidas en relación con la PPC

SUIMUN PARVO ERY INAC


Una vacuna, doble protección

Vacuna inactivada compleja contra la infección por parvovirus y la erisipela porcina.

Estimula la formación de una respuesta inmunitaria intensa dos semanas después de la vacunación, que se mantiene en las cerdas durante el período de gestación y lactancia hasta la revacunación antes de la siguiente inseminación.


No afecta al rendimiento de los animales. Vacunación sin reacciones adversas. Seguridad probada para cerdas de reposición

Peste porcina clásica



Programa de vacunación

Parvovirus y erisipela porcina



Programa de vacunación

Fabricante:

BioTestLab®



SUIMUN ADIVAC+

Medicamento de elección del Programa de erradicación de la enfermedad de Aujeszky en Ucrania. 2008-2017

Vacuna viva gE negativa contra la enfermedad de Aujeszky en cerdos, cepa Barta K61.

Protección rápida. Interrumpe la transmisión de la infección y elimina los síntomas clínicos en lechones recién nacidos tan solo 2 días después de la aplicación. Protege eficazmente contra la forma respiratoria de la enfermedad de Aujeszky y los problemas reproductivos asociados a ella.

Seguridad. La vacuna de la cepa Barta K61 es totalmente segura para cerdos de cualquier edad y peso, cerdas en cualquier período de cría, incluso en las últimas etapas de la gestación y durante la lactancia. Se permite la aplicación de la vacuna a cerdas gestantes 7 días antes del parto. No hay reacción en el lugar de la inyección.

Se administra por vía intramuscular e intranasal

De todas las vacunas marcadas, las vacunas vivas de la cepa Bartha K61 se consideran las más eficaces*. No son reactógenas, son más inmunógenas y favorecen la formación de inmunidad protectora tanto humoral como de células T.

*Delva JL, Nauwynck HJ, Mettenleiter TC, Favoreel HW. La cepa atenuada del virus de la pseudorrabia Bartha K61: breve reseña sobre los conocimientos adquiridos durante 60 años de investigación. Patógenos. 27 de octubre de 2020; 9(11):897

Enfermedad de Aujeszky



Programa de erradicación de la enfermedad de Aujeszky

- Vacunación masiva de cerdas y verracos
- Revacunación de cerdas y verracos al cabo de 3 semanas
- Vacunación de lechones de 10 semanas
- A continuación, esquema de vacunación estándar

*Según los resultados del seguimiento serológico de las muestras de sangre de los cerdos, se desarrollan los esquemas de vacunación óptimos para cada explotación.



Programa de vacunación

ANTIBIÓTICOS

Inyectable

AMOXAN PREMIUM	Suspensión de amoxicilina trihidrato, micronizada, L.A.
CLAMOXAN	Suspensión de amoxicilina trihidrato
CEFTIFUR-50	Suspensión de ceftiofur
DANOXAN-25	Solución de danofloxacino
ENROXAN-100	Solución de enrofloxacin
ENROXAN MAX	Suspensión de enrofloxacin, L.A.
FLOCINE-300	Solución de florfenicol
FLOSIDEX	Solución de florfenicol, tilosina y dexametasona
OTC-200 L.A.	Solución de oxitetraciclina, L.A.
PHARMAXIN-200	Solución de tartrato de tilosina
SPECTRAN	Suspensión de amoxicilina, betametasona
TIAPLASMIN-100	Solución de fumarato de hidrógeno de tiamulina

Polvos

AMOXAN-500	Polvo de amoxicilina trihidrato
COLIDOXYN	Polvo de hclato de doxiciclina, sulfato de colistina
COLITYL P	Polvo de sulfato de colistina, tartrato de tilosina
COLISTO 6M	Polvo de sulfato de colistina
DOXAN-50	Polvo de hclato de doxiciclina
OXYCOLIN	Polvo de clorhidrato de oxitetraciclina, sulfato de colistina
PHARMADOX P	Polvo de hclato de doxiciclina, tartrato de tilosina

Oral

DANOXAN-50	Solución de danofloxacino
ENROCOLIN	Solución de enrofloxacin, sulfato de colistina
ENROXAN-100	Solución de enrofloxacin
FLOCINE-100	Solución de florfenicol
TILMICON-250	Solución de tilmicosina
TRICOLIN	Solución de enrofloxacin, trimetoprima, sulfato de colistina

Externa

FLOXY-SPRAY	Spray de florfenicol
--------------------	----------------------

ANTIPARASITICS / ANTICOCCIDIAL

DORAN	Solución de doramectina inyectable
IVERON-10	Solución de ivermectina inyectable
TOLTRASAN-50	Solución oral de toltrazuril

PRODUCTOS DE VITAMINAS Y MINERALES

AMINOVITOL	Complejo hepatoprotector, solución oral
HEPACARNITOL	Complejo hepatoprotector, solución oral
FERRUM+ L-CYN	Agente antianémico complejo, inyectable vitamina B ₁₂ , B ₃ , L-carnitina y butafosfano, inyectable
STIMULUS	Complejo de sustancias biológicamente activas, inmunoestimulante

DESINFECTANTES

VIROSAN	Desinfectante con amplio espectro de actividad
VIROSAN MAX	Desinfectante con amplio espectro de actividad
VIROSAN F / F2	Desinfectante con amplio espectro de actividad

