

DORAN

DORAMECTINA 1 %.
SOLUCIÓN INYECTABLE



**NUEVO NIVEL DE PROTECCIÓN:
POR DENTRO Y POR FUERA**

PARASITICIDA
UNIVERSAL




ENDECTOCIDA DE NUEVA GENERACIÓN

DORAN (doramectina 1 %) —
macrólido antiparasitario
de nueva generación con
amplio espectro de acción



**Eficaz contra
más de 45 parásitos**



**de 20 a 40 días
de protección contra
la reinfestación**



**Curso de tratamiento —
1 inyección**

Ingredientes: doramectina- 10 mg/ml

Animales de destino: bovinos, ovinos,
porcinos

Disponible en: frascos de vidrio
multidosis de 100 ml

Vida útil: 24 meses.

Después de la primera dosis,
el medicamento debe usarse en un plazo de 28 días.

- **Máximo control de ectoparásitos y endoparásitos**, en comparación con los monomedicamentos inyectables con otros principios activos¹

- **Alta eficacia** contra la mayoría de los agentes causantes de nematodosis comunes en Ucrania. Activo contra diferentes etapas del desarrollo de los nematodos, incluidas las larvas L₄

- Acción prolongada, en comparación con los productos que contienen ivermectina^{2, 3}. Supera la resistencia a los principios activos de otros medicamentos

- Alto umbral de seguridad. Sin efectos mutagénicos, teratogénicos ni embriotóxicos. No afecta a la producción de inmunidad posvacunal

¹ Basado en la comparación de los prospectos del medicamento DORAN y de los monomedicamentos inyectables con principios activos ivermectina, moxidectina, eprinomectina y clozantel

² Lanusse C, Lifschitz A, Virkel G, et al. Cinética comparativa de la disposición plasmática de la ivermectina, la moxidectina y la doramectina en el ganado bovino. J Vet Pharmacol Ther. Abril de 1997 Abr;20(2):91-9. doi: 10.1046/j.1365-2885.1997.00825.x

³ Toutain P.L., Upson D.W., Terhune T.N., McKenzie M.E. Farmacocinética comparativa de la doramectina y la ivermectina en el ganado bovino. Vet Parasitol. 1997 Sep;72(1):3-8. doi: 10.1016/s0304-4017(97)00070-8



AMPLIA GAMA DE ACCIÓN

	Bovinos	Ovinos	Cerdos
Nematodos del tracto digestivo	<i>Bunostomum phlebotomum</i> ① <i>Cooperia oncophora</i> ① <i>C.pectinata</i> ① <i>C.punctata</i> ① <i>C.surnabada</i> ① <i>Ostertagia ostertagi</i> ① <i>O.lyrata</i> ○ <i>Haemonchus placei</i> ① <i>Nematodirus helvanicus</i> ① <i>Nematodirus spathiger</i> ○ <i>Oesophagostomum radiatum</i> ① <i>Strongyloides papillosus</i> ① <i>T.colubriformis</i> ① <i>Trichostrongylus axei</i> ① <i>Trichuris spp.</i> ○	<i>Chabertia ovina</i> ○ <i>Cooperia curticei</i> ● <i>Cooperia oncophora</i> ① <i>Gaigeria pachyscelis</i> ① <i>Haemonchus contortus</i> ① <i>Nematodirus battus</i> ● <i>Oesophagostomum columbianum</i> ① <i>Ostertagia circumcincta</i> ① <i>Strongyloides papillosus</i> ① <i>Trichostrongylus axei</i> ① <i>Trichostrongylus colubriformis</i> ① <i>Trichostrongylus vitrinus</i> ① <i>Trichuris spp.</i> ○	<i>Ascaris suum</i> ① <i>Hyostrogylus rubidus</i> ① <i>Oesophagostomum dentatum</i> ① <i>Oesophagostomum quadrispinulatum</i> ① <i>Strongyloides ransomi</i> ①
Helminfos pulmonares	<i>Dictyocaulus viviparus</i> ○	<i>Dictyocaulus filaria</i> ○	<i>Metastrongylus spp.</i> ○
Helminfos renales			<i>Stephanurus dentatus</i> ○
Helminfos oculares	<i>Thelazia spp.</i> ○		
Larvas Hypoderma	<i>Hypoderma bovis</i> <i>H.lineatum</i>		
Larvas de la mosca de la cavidad nasal		<i>Oestrus ovis</i>	
Piojos	<i>Damalinia bovis</i> <i>Haematopinus euryternus</i> <i>Linognathus vituli</i> <i>Solenopotes capillatus</i>		<i>Haematopinus suis</i>
Aradores de la sarna	<i>Chorioptes bovis</i> <i>Psoroptes bovis</i> <i>Sarcoptes bovis</i>	<i>Psoroptes ovis</i>	<i>Sarcoptes suis</i>

○Sexualmente maduros ●Larvas en estadio L₄ ①Sexualmente maduros y larvas en estadio L₄.

Protección prolongada contra la reinfección del ganado bovino

<i>O. radiatum, C. oncophora</i>	21 días	<i>Dictyocaulus viviparus</i>	35 días
<i>Bunostomum phlebotomum</i>	22 días	<i>Ostertagia ostertagi</i>	35 días
<i>Bunostomum phlebotomum</i>	28 días	<i>Linognathus vituli</i>	28 días
<i>Trichostrongylus axei</i>	28 días	<i>Psoroptes bovis</i>	42 días

DORAN protege a los cerdos contra la infestación o reinfestación por ácaros *Sarcoptes scabiei* durante 18 días.






FÁCIL DE USAR

Tipo de animal	Dosis	Método de administración*
Bovinos	1 ml/50 kg p.c.**	Una sola vez por vía subcutánea en la zona del cuello
Ovinos		Una sola vez por vía intramuscular
Cerdos	1 ml/33 kg p.c.**	

*Dosis máxima de DORAN en un solo lugar de inyección para bovinos: 5 ml; ovinos: 1,5 ml; porcinos: 2,5 ml

**En enfermedades de ovinos causadas por *Psoroptes ovis* y *Nematodirus battus* (etapa sexualmente madura): 1 ml/33 kg de peso vivo.

Esquemas recomendados para la prevención de parasitosis



Facilidad de dosificación

Bovinos, ovinos

Peso corporal del animal, kg	Dosis, ml
50	1,0
100	2,0
150	3,0
200	4,0
250	5,0
300	6,0
350	7,0
400	8,0
450	9,0
500	10,0

Lechones con peso corporal de hasta 16 kg

Peso corporal del animal, kg	Dosis, ml
<4	0,1
5-7	0,2
8-10	0,3
11-13	0,4
14-16	0,5

Carencia

Carne: bovinos, ovinos: 70 días; cerdos: 77 días.
Leche: No utilizar en: vacas y novillas 60 días antes del parto; animales cuya leche esté destinada al consumo humano

Fabricante:



www.biotestlab.ua | info@biotestlab.ua

